

# Oiseaux forestiers et bois mort

Environ 100 espèces d'oiseaux peuplent nos forêts. Au moins les deux tiers d'entre elles dépendent d'une manière ou d'une autre du bois mort. Cette dépendance est plus ou moins forte selon les espèces. Alors que quelques espèces ne peuvent pas survivre sans bois mort, d'autres ne l'utilisent qu'occasionnellement et uniquement si l'offre est abondante. Certaines espèces d'oiseaux **consomment** les insectes qui vivent sur et dans le bois mort. D'autres espèces utilisent les cavités et fissures des arbres morts pour **nicher** ou **dormir**.



Le pic tridactyle est un véritable spécialiste du bois mort. Il vit dans les forêts d'épicéas subalpines où il a besoin d'au moins 20m<sup>3</sup> de bois mort sur pied par hectare. Il se nourrit d'invertébrés variés qu'il recherche sur les troncs morts. Il aime façonner ses cavités dans les arbres morts.



Même si le pic épeiche n'est pas très exigeant quant à son habitat, il a aussi besoin de bois pourri pour creuser sa loge. Comme les autres pics, il inspecte les arbres morts en quête d'insectes et de leurs larves.



Le pic noir peuple les forêts feuillues du Plateau et les forêts de conifères des Préalpes. Il construit ses cavités de préférence dans les vieux hêtres larges d'au moins 40 cm. Il recherche fourmis et larves de coléoptères sur les souches pourries et les arbres morts.

Comme tous les pics, il apprécie aussi le bois mort comme caisse de résonance pour son tambourinage.



Il n'y a pas que les pics qui construisent des cavités: les mésanges boréale et huppée font partie des quelques espèces d'oiseaux capables de façonner leurs cavités elles-mêmes. Elles ont besoin pour cela du bois tendre et vermoulu des saules, peupliers ou bouleaux.



**Les grimpereaux font volontiers leur nid entre l'écorce et le tronc des arbres morts. Tout comme la sittelle, ils parcourent les troncs à écorce grossière à la recherche d'insectes et d'araignées.** La sittelle utilise parfois des cavités dont l'ouverture est trop grande. Elle la colmate alors à sa taille avec un mélange de terre et de salive. Le rougegorge familier et le troglodyte mignon apprécient les tas de branches pour nicher.

De nombreux oiseaux sont incapables de creuser eux-mêmes leur cavité de nidification. La chevêchette d'Europe, le pigeon colombin, le gobemouche noir et le choucas des tours utilisent ainsi les cavités abandonnées des pics pour nicher.