Braunkehlchen – Vogel des Jahres 2027

Tarier des prés – Oiseau de l’année 2027

Stiaccino – Uccello dell’anno 2027



Ralph Martin

BirdLife
Schweiz/Suisse/Svizzera

Das Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)

Die Schweizer Bevölkerung hat das Braunkehlchen zum Vogel des Jahres 2027 gewählt. Von Zaunpfählen und Stauden aus behält der kleine Langstreckenzieher die Wiese stets im Blick. Er brütet am Boden inmitten blütenreicher Wiesen und ist auf diesen selten gewordenen Lebensraum angewiesen. Als Botschafter zeigt das Braunkehlchen, wie viel Leben in extensiv genutztem Wiesland steckt. Und es zeigt, was möglich ist, wenn Naturschutz, Landwirtschaft und Politik gemeinsam handeln.



Von seiner Sitzwarte aus behält das Männchen mit dem leuchtend weissen Überaugenstreif die Wiese stets im Blick. *Depuis son poste d'observation, le mâle, au sourcil d'un blanc éclatant, garde en permanence la prairie à l'œil.*
Foto: Ralph Martin

Wartenjäger mit hellem Blick

Das Braunkehlchen ist mit 12 bis 14 cm etwas kleiner als ein Haussperling und wiegt nur 15 bis 20 g. Unverwechselbar ist der helle Streif über dem Auge. Beim Männchen ist er leuchtend weiss und hebt sich deutlich von den dunklen Wangen ab. Kehle und Brust sind orange-braun, die Oberseite ist variabel braun-schwarz gemustert. Am liebsten sitzt das Braunkehlchen auf einem Staudenstängel, niedrigem Gebüsch oder auch einem Zaunpfahl. Von dieser Warte aus erspäht es Insekten, packt sie in kurzem, wendigem Flug am Boden oder in der Luft und kehrt dann auf seinen Ausguck zurück. Auf dem Speiseplan stehen Raupen, Käfer, Heuschrecken, Fliegen oder Spinnen. Sein Gesang besteht aus kurzen, rasch vorgetragenen Strophen mit schmatzenden, ratternden und flötenden Lauten. Gerne baut es auch Stimmen anderer Vogelarten ein.

Winziger Vogel, riesige Reise

Braunkehlchen sind Langstreckenzieher und verbringen den Winter in den afrikanischen Savannen südlich der Sahara. Die Wüste können sie dabei in knapp zwei Tagen ohne Pause überqueren. Sie sind einzeln unterwegs, so dass auch Jungvögel den Weg ins Winterquartier ganz alleine finden müssen. Ab April kehren die ersten Braunkehlchen zu uns zurück, im August und September ziehen sie wieder nach Süden. Bei uns besiedeln sie offene, feuchte bis mässig trockene Wiesen und Weiden mit herausragenden Strukturen wie Hochstauden, Zäunen oder einzelnen, niedrigen Büschen. Wälder und grosse Hecken meiden sie und halten meist mindestens 200 m Abstand, da dort Fressfeinde lauern. Einst war das Braunkehlchen weit verbreitet. Heute brütet es fast nur noch in den Alpen und Voralpen, vor allem zwischen 1600 und 2100 m.

Gut versteckt im hohen Gras

Kurz nach der Ankunft besetzen die Männchen ihre Reviere und singen von erhöhten Warten aus. Das Weibchen baut das Nest am Boden in der Krautschicht, oft am Fuss einer Staude. Es ist so gut versteckt, dass man es selbst aus ein bis zwei Metern Entfernung kaum entdeckt. Ab Mai, in höheren Lagen erst im Juni, legt das Weibchen fünf bis sieben Eier und bebrütet sie knapp zwei Wochen lang allein. Beide Eltern füttern die Jungen mit Insekten. Nach 11 bis 15 Tagen verlassen die Jungvögel das Nest, noch bevor sie fliegen können, und verstecken sich einzeln im Gras. Erst mit 17 bis 19 Tagen sind sie flugfähig. Falls die Brut frühzeitig verloren geht, kann es das Paar noch mit einer Ersatzbrut versuchen.

Wenn die Wiese verstummt

Das Braunkehlchen steht als «verletzlich» auf der Roten Liste der Brutvögel der Schweiz. Der Bestand wird auf noch 6000 bis 9000 Paare geschätzt und nimmt weiter ab. Aus dem Mittelland ist die Art bis auf wenige Restvorkommen verschwunden, und auch in den Bergen geht der Bestand zurück. Hauptursache ist der Verlust geeigneter Lebensräume. Überdüngte Wiesen sind deutlich artenärmer, wachsen schneller und werden früher und häufiger gemäht. Fällt die Mahd in die Brutzeit, werden Gelege und Jungvögel vernichtet, oft auch das brütende Weibchen. In eintönigen Grasflächen fehlen zudem die Insekten als Nahrung. Die Ursache liegt aber oft nicht beim fehlenden Engagement der Bewirtschaftenden, sondern bei einer Agrarpolitik, die falsche Anreize setzt.

Bunte Wiesen für die Zukunft

Braunkehlchen brauchen wenig gedüngte, insekten- und blütenreiche Wiesen, die erst spät gemäht werden. Altgrasstreifen, eine gestaffelte Mahd und schonende Balkenmäher geben Jungvögeln und Insekten eine Chance. Hochstauden, Zaunpfähle oder andere künstliche Sitzwarten dienen als Ausguck. Wie Förderung wirkt, zeigt BirdLife Schweiz seit 2016 in den Schwyzer Moorlandschaften Rothenthurm, Schwantenau und Breitried. Gemeinsam mit Landwirtschaftsbetrieben, kantonalen Fachstellen und Freiwilligen wurden dort über 18 Hektaren entbuscht und Moorflächen wiedervernässt. Zudem wurden Sitzwarten aufgestellt und Verträge für eine späte Mahd abgeschlossen. Damit Wiesenbrüter auch zukünftig eine Chance haben, setzt sich BirdLife für eine Agrarpolitik ein, die Nährstoffüberschüsse senkt, Insekten fördert, neue Mahdstrategien ermöglicht und Leistungen für die Biodiversität besser belohnt. Die noch bestehenden Brutgebiete müssen unbedingt erhalten bleiben.



Das Weibchen ist weniger lebhaft gefärbt, weisst aber den gleichen Überaugenstreif auf. *La femelle, d'une coloration plus terne, arbore le même sourcil clair.*
Foto: Ralph Martin

Tarier des prés (*Saxicola rubetra*)

La population suisse a élu le Tarier des prés Oiseau de l'année 2027. Depuis les piquets de clôture et les hautes herbes, ce petit migrateur au long cours garde toujours la prairie à l'œil. Il niche au sol au milieu de prairies riches en fleurs et dépend de ce milieu devenu rare. En tant qu'ambassadeur, le Tarier des prés illustre la richesse du vivant d'une prairie exploitée de manière extensive. Il montre aussi ce qui est possible lorsque la protection de la nature, l'agriculture et les milieux politiques agissent ensemble.

Guetteur au sourcil clair

Avec ses 12 à 14 cm et ses 15 à 20 g, le Tarier des prés est un peu plus petit que le Moineau domestique. Son sourcil clair est caractéristique. Chez le mâle, il est d'un blanc éclatant et contraste avec les joues sombres. La gorge et la poitrine sont brun orangé, tandis que le dessus est brun-noir. Le Tarier des prés se perche souvent sur une tige herbacée, un buisson bas ou encore un piquet. De ce poste d'observation, il repère des insectes, les saisit au sol ou en vol, puis retourne sur son perchoir. Son menu se compose de chenilles, de coléoptères, de sauterelles, de mouches et d'araignées. Son chant est fait de courtes strophes débitées rapidement, avec des sons rêches et des notes claires. Il y intègre volontiers des imitations d'autres oiseaux.



Blüten- und artenreiche Wiesen mit guter Vegetationsstruktur bieten Deckung und Brutplätze, Nahrung und Sitzwarten. *Les prairies riches en fleurs et en insectes, dotées d'une bonne structure végétale, offrent des abris, des sites de nidification, de la nourriture et des perchoirs.*
Foto: Michael Gerber

Minuscule oiseau, voyage immense

Les Tariers des prés sont des migrateurs au long cours. Ils passent l'hiver dans les savanes africaines au sud du Sahara. Ils peuvent traverser le désert en à peine deux jours, sans escale. Ils voyagent en solitaire, les jeunes doivent trouver seuls le chemin des quartiers d'hiver. Dès avril, les premiers Tariers des prés reviennent en Suisse ; en août et en septembre, ils repartent vers le sud. Chez nous, ils s'installent dans les prairies et les pâturages ouverts, humides à modérément secs, pourvus de structures qui dépassent, comme des herbes hautes, des clôtures ou des buissons bas isolés. Ils évitent les forêts et les grandes haies et s'établissent généralement à une distance d'au moins 200 m, car des prédateurs y sont à l'affût. Autrefois, le Tarier des prés était très répandu. Aujourd'hui, il ne niche presque plus que dans les Alpes et les Préalpes, surtout entre 1600 et 2100 m.

Bien cachés dans les hautes herbes

Peu après leur arrivée, les mâles occupent leur territoire et chantent depuis des postes surélevés. La femelle construit le nid au sol, bien dissimulé dans la strate herbacée. Dès mai, ou juin en altitude, la femelle pond cinq à sept œufs et les couve seule pendant près de deux semaines. Les deux parents nourrissent les jeunes avec des insectes. Après 11 à 15 jours, les jeunes quittent le nid avant de savoir voler et se cachent séparément dans l'herbe. Ils ne sont capables de voler qu'à l'âge de 17 à 19 jours. Si la nichée est perdue prématurément, le couple peut tenter une couvée de remplacement.

Quand la prairie se fait silencieuse

Le Tarier des prés figure dans la catégorie « vulnérable » de la Liste rouge des oiseaux nicheurs de Suisse. Sa population, en diminution, est estimée à 6000 à 9000 couples. L'espèce a disparu du Plateau à l'exception de rares populations résiduelles, et les effectifs reculent aussi en montagne. La cause principale est la perte de milieux appropriés. Les prairies surfertilisées sont pauvres en espèces, poussent plus vite et sont fauchées plus tôt et plus souvent. Lorsque la fauche tombe pendant la période de nidification, les pontes et les jeunes sont détruits. Dans les herbages uniformes, les insectes font en outre défaut. Le manque d'engagement des exploitant·e·s n'est souvent pas en cause, le problème vient de la politique agricole qui crée de mauvaises incitations.

Des prairies fleuries pour l'avenir

Les Tariers des prés ont besoin de prairies peu fertilisées, riches en insectes et en fleurs, fauchées tardivement. Des bandes d'herbe non fauchée, une fauche échelonnée et des faucheuses à barre de coupe laissent une chance aux jeunes oiseaux et aux insectes. À Rothenthurm, Schwantenau et Breitried (SZ), BirdLife Suisse montre depuis 2016 comment la conservation fonctionne. En collaboration avec des exploitations agricoles, les services cantonaux et des bénévoles, plus de 18 hectares y ont été débroussaillés et des surfaces de marais ont été remises en eau. Des perchoirs ont été installés et des contrats de fauche tardive ont été conclus. BirdLife s'engage aussi pour une politique agricole qui récompense mieux les prestations en faveur de la biodiversité. Et les zones de nidification encore existantes doivent absolument être conservées.



Sattgrüne Graswiesen, die zudem schon früh gemäht sind, bieten für Wiesenbrüter weder Nahrung noch Brutplätze. *Les herbages d'un vert intense, qui sont aussi fauchées très tôt, n'offrent aux oiseaux nicheurs des prairies ni nourriture ni sites de nidification.*
Foto: Stefan Greif

BirdLife Schweiz/Suisse/Svizzera

Gemeinsam für die Biodiversität – lokal bis weltweit
Naturschutzvereine in den Gemeinden | Kantonalverbände
BirdLife Schweiz | BirdLife International

birdlife.ch